

## SÈRIE 1

## RECORDEU:

- Podeu valorar amb tants decimals com considereu convenient, tanmateix aconsellem no fer-ho en més de dos decimals.
- Cal arrodonir a un decimal la nota final de l'examen, no les notes parcials.
- Cal traslladar la puntuació de cada pregunta a la casella **amb el número corresponent** de la primera pàgina de l'examen.

1. D'una funció  $y = f(x)$  sabem que la seva derivada és  $f'(x) = x^3 - 4x$ .
- a. Determineu els intervals de creixement i de decreixement de la funció  $y = f(x)$ . [1 punt]
  - b. Determineu les abscisses dels seus extrems relatius i classifiqueu-los. [1 punt]


Observem que  $f'(x) = x^3 - 4x = x \cdot (x-2) \cdot (x+2)$ . Per tant, si igualem la derivada a zero, obtenim tres solucions  $x=0$ ,  $x=-2$  i  $x=2$ .

- a) Resolem:  $f'(x) > 0$ , d'on s'obté que la funció creix si  $x$  pertany als intervals  $(-2,0)$  i  $(2,+\infty)$  i  $f'(x) < 0$ , d'on obtenim que la funció decreix en els intervals  $(-\infty,-2)$  i  $(0,2)$ .
- b) La funció té un màxim relatiu en el punt d'abscissa  $x=0$  i dos mínims relatius en els punts d'abscissa  $x=2$  i  $x=-2$ . Sabem de quin tipus d'extrems relatius es tracta pels intervals de creixement i de decreixement de l'apartat anterior.

*Criteris de correcció: a) Determinació dels punts que anul·len la derivada: 0,5 p. Determinació dels intervals de creixement i decreixement: 0,5 p. b) Determinació dels extrems relatius: 0,5 p. Classificació i justificació de si són màxims o mínims: 0,5 p.*

2. Des d'una barca es dispara una bengala de salvament marítim que s'apaga al cap de 4 minuts. En aquest interval de temps, es comprova que la intensitat lumínica de la bengala en funció del temps, mesurada en percentatges del 0% al 100%, queda perfectament descrita per l'expressió  $L(t) = 25t \cdot (4-t)$ , on el temps  $t$  varia entre 0 i 4 minuts.
- a. Calculeu per a quin valor de  $t$  el percentatge d'intensitat lumínica serà màxim. [1 punt]
  - b. Si des de la costa la bengala només és visible quan la intensitat lumínica és superior al 75%, quin és l'interval de temps en què serà visible des de la costa i, per tant, serà més factible el salvament? [1 punt]

- a) El percentatge d'intensitat lumínica ve donat per la funció  $L(t) = 25t(4-t)$ , amb  $0 \leq t \leq 4$ , que és una funció quadràtica que té per gràfica una paràbola:




Cal, doncs, calcular el màxim d'aquesta funció; ho podem fer calculant el vèrtex de la paràbola, o bé per derivació:

$$L'(t) = 100 - 50t = 0 \Rightarrow t = 2 \text{ minuts.}$$

Com que  $L'(1) > 0$  i  $L'(3) < 0$  es tracta efectivament d'un màxim. Per tant, després de 2 minuts del llançament, la intensitat serà màxima.

- b) Hem de resoldre la inequació  $100t - 25t^2 > 75$ .



Resolem l'equació de segon grau associada:

$$-25t^2 + 100t - 75 = 0 \rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0$$

$$t = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 3}}{2} = \frac{-4 \pm 2}{2} = \begin{cases} 3 \\ 1 \end{cases}, \text{ que són els}$$

punts de tall de la paràbola amb la recta  $y = 75$ .

Per tant, per a  $t$  tal que  $1 < t < 3$  la intensitat lumínica de la bengala superarà el 75% i aquest serà l'interval de temps en què el salvament serà més factible.

*Criteris de correcció: a) Plantejament del problema: 0,25 p. Càlcul de la derivada: 0,25 p. Obtenció del màxim: 0,25 p. Justificació que es tracta d'un màxim: 0,25 p. b) Plantejament de la inequació: 0,25 p. Determinació de l'interval: 0,75 p.*

3. Considereu les matrius  $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  i  $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ m & n \end{pmatrix}$ , on  $m$  i  $n$  són dos nombres reals.

- a) Comproveu que es compleix la igualtat  $(A - B) \cdot (A + B) = A^2 - B^2$ . [1 punt]
- b) Determineu  $m$  i  $n$  per tal que les matrius  $B$  i  $C$  commutïn, és a dir,  $B \cdot C = C \cdot B$ . [1 punt]

a) Tenim  $A - B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$  i  $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$ , per tant

$$(A - B) \cdot (A + B) = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 10 \\ 10 & 25 \end{pmatrix}$$

D'altra banda  $A^2 = \begin{pmatrix} 26 & 10 \\ 10 & 26 \end{pmatrix}$  i  $B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , d'on es dedueix que es verifica la igualtat demanada.

Alternativament, podem desenvolupar  $(A - B) \cdot (A + B)$  i argumentar que per comprovar que es compleix la igualtat n'hi ha prou de veure que  $A$  i  $B$  commuten:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix},$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

b) Calculem els dos productes:

$$B \cdot C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ m & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m & n \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ m & n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ n & m \end{pmatrix}$$

Per tant commuten si i només si  $m = -1$  i  $n = 1$ .

*Criteris de correcció: a) Càlcul de  $A - B$ : 0,25 p. Càlcul de  $A + B$ : 0,25 p. Càlcul de  $A^2$ : 0,25 p. Càlcul de  $B^2$ : 0,25 p. b) Càlcul de  $B \cdot C$ : 0,25 p. Càlcul de  $C \cdot B$ : 0,25 p. Determinació dels valors  $m$  i  $n$ : 0,5 p. (Si s'ha resolt a) utilitzant que  $A$  i  $B$  commuten: 0.5 p. per justificar-ho i 0.5 p. per comprovar-ho).*

4. Tenim unes quantes monedes d'un euro distribuïdes en tres piles. Passem dotze monedes de la tercera pila a la segona i, a continuació, en passem deu de la segona a la primera. Un cop fet això, les tres piles tenen la mateixa quantitat de monedes.
- a) Amb aquestes dades, podem determinar la quantitat de monedes que hi havia inicialment en cada pila? Raoneu la resposta. [1 punt]
- b) Esbrineu la quantitat de monedes que hi havia inicialment a cada pila si sabem que en total hi ha 51 monedes. [1 punt]

Anomenem  $x$  la quantitat de monedes que hi havia inicialment en la primera pila,  $y$  la quantitat de monedes que hi havia inicialment en la segona pila i, finalment,  $z$  la quantitat de monedes que hi havia inicialment en la tercera pila.

Un cop fet el traspàs de monedes descrit en l'enunciat, el contingut de cada pila és:

Primera pila:  $x + 10$  monedes.

Segona pila:  $y + 2$  monedes.

Tercera pila:  $z - 12$  monedes.

a) Sabem que la quantitat de monedes de cada pila és la mateixa, per tant:

$$\begin{cases} x + 10 = y + 2 \\ x + 10 = z - 12 \end{cases}$$

Ordenant el sistema tenim:

$$\begin{cases} x - y = -8 \\ x - z = -22 \end{cases}$$

I resolent-lo pel mètode de Gauss tenim:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -8 \\ 1 & 0 & -1 & -22 \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & -14 \end{array}\right)$$

Es tracta, per tant, d'un sistema compatible indeterminat. La solució ve expressada en funció d'un paràmetre. Prenent  $z$  com a paràmetre i aïllant adequadament, la solució és:

$$\begin{cases} x = z - 22 \\ y = z - 14 \\ z \end{cases}$$

Per tant, no podem determinar la quantitat de monedes que hi havia inicialment.

b) Si a més sabem que en total hi ha 51 monedes, aleshores tenim una equació més:

$$\begin{cases} x - y = -8 \\ x - z = -22 \\ x + y + z = 51 \end{cases}$$

Resolent per Gauss tenim:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -8 \\ 1 & 0 & -1 & -22 \\ 1 & 1 & 1 & 51 \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & -14 \\ 0 & 2 & 1 & 59 \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & -14 \\ 0 & 0 & 3 & 87 \end{array}\right)$$

De la tercera equació,  $3z = 87$ , és a dir,  $z = 29$ .

De la segona equació,  $y - z = -14$ , és a dir,  $y = 15$ .

De la primera equació,  $x - y = -8$ , és a dir,  $x = 7$ .

Per tant, inicialment en la primera pila hi havia 7 monedes, en la segona pila hi havia 15 monedes i en la tercera pila hi havia 29 monedes.

Alternativament, com que les tres piles tenen la mateixa quantitat de monedes, a cada una n'hi haurà 17 i poden obtenir la solució resolent


$$\begin{cases} x + 10 = 17 \\ y + 2 = 17 \\ z - 12 = 17 \end{cases}$$

*Criteris de correcció: a) Plantejament del sistema: 0,5 p. Justificació que es tracta d'un sistema compatible indeterminat: 0,5 p. b) Plantejament del sistema: 0,25 p. Resolució del sistema: 0,75 p. (En cas que hagin resolt l'apartat b) utilitzant el plantejament alternatiu 0.5 p. pel plantejament i 0.5 p. per la resolució.)*

5. Una companyia aèria vol organitzar per aquest estiu un pont aeri entre l'aeroport de Barcelona - el Prat i el de Palma de Mallorca, amb places suficients de passatge i càrrega, per a transportar com a mínim 1.600 persones i 96 tones d'equipatge i mercaderies. Per a fer-ho, té a la seva disposició 11 avions del tipus A, que poden transportar 200 persones i 6 tones d'equipatge i mercaderies cadascun, i 8 avions del tipus B que poden transportar 100 persones i 15 tones cadascun. Si la contractació d'un avió del tipus A costa 4.000 euros i la d'un avió del tipus B en costa 1.000,
- Determineu la funció objectiu, les restriccions i dibuixeu la regió de les possibles opcions que té la companyia. [1 punt]
  - Calculeu el nombre d'avions de cada tipus que cal contractar perquè el cost sigui el mínim i determineu quin és aquest cost mínim. [1 punt]

a) Taula de dades:

Avions	x= tipus A	y= tipus B	Mínims
Persones	200	100	1600
Tones d'equipatge i mercaderies	6	15	96
Disponibles	11	8	
Preu (euros)	4000	1000	



La funció objectiu ve donada per  $\text{Cost}(x,y) = 4000x + 1000y$  i les restriccions venen donades per les inequacions:

$$\begin{aligned} 2x + y &\geq 16 \\ 2x + 5y &\geq 32 \\ x &\leq 11 \\ y &\leq 8 \end{aligned}$$

b) Veiem on s'assoleix el cost mínim:

$$\text{Cost}(A) = 4000 \cdot 6 + 1000 \cdot 4 = 28000 \text{ €}$$

$$\text{Cost}(B) = 4000 \cdot 11 + 1000 \cdot 2 = 46000 \text{ €}$$

$$\text{Cost}(C) = 4000 \cdot 11 + 1000 \cdot 8 = 52000 \text{ €}$$

$$\text{Cost}(D) = 4000 \cdot 4 + 1000 \cdot 8 = 24000 \text{ €}$$

Així doncs, cal contractar 4 avions del tipus A i 8 del tipus B per obtenir un cost mínim de 24.000 euros.

*Criteris de correcció: a) Determinació de les restriccions: 0,5 p. Dibuix de les restriccions: 0,25 p. Determinació de la funció objectiu: 0,25 p. b) Determinació dels vèrtexs: 0,5 p. Determinació del mínim: 0,5 p.*

6. Considereu la funció  $f(x) = -x^2 + bx + c$  amb  $b$  i  $c$  nombres reals.
- Trobeu  $b$  i  $c$  de manera que la gràfica de la funció passi pel punt  $(-1,0)$  i tingui un extrem local en el punt d'abscissa  $x = 3$ . Raoneu de quin tipus d'extrem relatiu es tracta. [1 punt]
  - Per al cas  $b = 3$  i  $c = 2$ , trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica que és paral·lela a la recta  $y = 5x - 2$ . [1 punt]

- a) Calculem la primera derivada  $f'(x) = -2x + b$  i plantejem el sistema d'equacions que permet calcular  $a$  i  $b$ , imposant que passi pel punt  $(-1,0)$  i que la derivada en  $x = 3$  s'anul·li.

$$\left. \begin{array}{l} -1 - b + c = 0 \\ -2 \cdot 3 + b = 0 \end{array} \right\} \text{i per tant, } b = 6 \text{ i } c = 7.$$

Si estudiem on és positiva i on és negativa la funció  $f'(x)$ , observem que  $f'(x) > 0$  per a  $x < 3$  i que  $f'(x) < 0$  per a  $x > 3$ . Per tant es tracta d'un màxim. Alternativament poden argumentar que es tracta d'un màxim geomètricament, tenint en compte que es tracta d'una paràbola amb el coeficient del terme quadràtic negatiu.

- b) En aquest cas la derivada és  $f'(x) = -2x + b = -2x + 3$ . Cal trobar el valor de  $x$  tal que  $f'(x) = 5$ , per tant  $-2x + 3 = 5$ , i obtenim  $x = -1$ . Per al punt d'abscissa  $x = -1$  tenim que l'ordenada és  $y = -1 - 3 + 2 = -2$ . Per tant, l'equació de la recta tangent és  $y + 2 = 5(x + 1)$ , és a dir,  $y = 5x + 3$ .

*Criteris de correcció: a) Plantejament del sistema: 0,5 p. Resolució: 0,25 p. Justificació que es tracta d'un màxim: 0,25 p. b) Determinació del pendent de la recta: 0,25 p. Obtenció del punt de tangència: 0,25 p. Obtenció de la recta tangent: 0,5 p.*


## SÈRIE 5

## RECORDEU:

- Podeu valorar amb tants decimals com considereu convenient, però aconsellem no fer-ho amb més de dos decimals.
- Cal arrodonir a un decimal la nota final de l'examen, no les notes parcials.
- Cal traslladar la puntuació de cada pregunta a la casella **amb el número corresponent** de la primera pàgina de l'examen.

## 2. [2 punts]

Denotem per a  $x$  i  $y$  el nombre d'anells produïts dels models A i B, respectivament. La restricció dels grams de plata disponibles s'expressa com  $6x + 2y \leq 150$  i la del nombre d'hores com  $3x + 6y \leq 180$ . A més cal que  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$ . La regió factible és per tant:



i té vèrtexs:  $A=(0,0)$ ,  $B=(25,0)$ ,  $C=(18,21)$  i  $D=(0,30)$ . La funció objectiu és d'altra banda  $F(x,y) = 35x + 55y$ . Avaluant-la als quatre vèrtexs s'obté  $F(A) = 0$ ,  $F(B) = 875$ ,  $F(C) = 1785$  i  $F(D) = 1650$ . Deduïm, per tant, que el benefici màxim s'obté produint 18 anells del model A i 21 anells del model B i que és de 1.785 euros.

*Criteris de correcció. Determinació de les restriccions: 0,5 p. Determinació de la funció objectiu: 0,5 p. Determinació dels vèrtexs: 0,5 p. Determinació del màxim: 0,5 p.*

Roc, en Martí i en Guiu decideixen fer la feina entre tots tres: en Martí reparteix un

20 % del total; en Guiu reparteix 100 fulls més que en Roc, i entre en Roc i en Martí en reparteixen 850.

- Calculeu el nombre de fulls que ha repartit cadascun d'ells. [1 punt]
- Un cop acabada la feina, decideixen dividir els guanys entre tots tres, proporcionalment als fulls repartits. Segons aquest criteri, quants diners cobrarà en Guiu, quants en cobrarà en Roc i quants en Martí? [1 punt]

a) Suposem que  $x$ ,  $y$  i  $z$  són respectivament el nombre de fulls repartits per en Roc, en Martí i en Guiu.

Les dades del problema es tradueixen algebraicament en el sistema d'equacions:

$$\left. \begin{array}{l} y = 0,2 \cdot (x + y + z) \\ z = x + 100 \\ x + y = 850 \end{array} \right\}$$

Ara resollem per Gauss, arreglant i simplificant les equacions:

$$\left. \begin{array}{l} 0,2x - 0,8y + 0,2z = 0 \\ x \quad \quad - z = -100 \\ x + y \quad \quad = 850 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} x - 4y + z = 0 \\ x \quad \quad - z = -100 \\ x + y \quad \quad = 850 \end{array} \right\}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -100 \\ 1 & 1 & 0 & 850 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} f_2 - f_1 \\ f_3 - f_1 \end{array} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & -100 \\ 0 & 5 & -1 & 850 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow 4f_3 - 5f_2 \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & -100 \\ 0 & 0 & 6 & 3900 \end{array} \right) \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x - 4y + z = 0 \\ 4y - 2z = -100 \\ 6z = 3900 \end{array} \right\}$$

I obtenim  $z = 650$   $y = 300$   $x = 550$

Per tant, en Roc va repartir 550 fulls, en Martí en va repartir 300 i en Guiu, 650.

b) En total han repartit  $x + y + z = 550 + 300 + 650 = 1500$  fulls. L'empresa ha pagat per la feina 225 euros.

Calculem a quant es paga el full repartit:  $225\text{€} : 1500 \text{ fulls} = 0,15 \text{ €/full}$

Per tant, en Roc cobrarà  $550 \cdot 0,15 = 82,5$  euros, en Martí cobrarà  $300 \cdot 0,15 = 45$  euros i, finalment, en Guiu  $650 \cdot 0,15 = 97,5$  euros.

*Criteris de correcció: a) Plantejament del sistema: 0,5 p. Resolució: 0,5 p. b) Càlcul del preu obtingut per full repartit: 0,5 p. Solució final: 0,5 p.*



4. L'any 2008 la nòmina d'un treballador era de 1000 euros. L'any 2009, l'empresa on treballava va decidir reduir-li la nòmina en un 10%. L'any 2010, amb la intenció de recuperar la situació econòmica del treballador, l'empresa va decidir incrementar-li la nòmina en un 10%.
- Calculeu la nòmina del treballador que va resultar de la baixada del 10% de l'any 2009. [0,5 punts]
  - Calculeu la nòmina del treballador que va resultar de la pujada del 10% de l'any 2010. [0,5 punts]
  - Si una nòmina de 1.000 euros ha patit una reducció d'un 10%, quin increment s'ha d'aplicar a la nova nòmina per recuperar el sou de 1000 euros? [1 punt]
- a) Calculem la nòmina del treballador que va resultar de la baixada del 10% de l'any 2009.

$$1000 - \frac{10}{100} \cdot 1000 = 900 \text{ euros}$$

- b) Calculem la nòmina del treballador que va resultar de la pujada del 10% de l'any 2010.

$$900 + \frac{10}{100} \cdot 900 = 990 \text{ euros}$$

- c) Si una nòmina de 1000 euros pateix una reducció d'un 10%, tindrem una nova nòmina de 900 euros. Si ara l'incrementem en un  $y$  % tindrem

$$900 + \frac{y}{100} \cdot 900$$

Imposem ara que aquest valor sigui 1000 i aïllem  $y$

$$900 + \frac{y}{100} \cdot 900 = 1000$$


$$9y = 100$$

$$y = \frac{100}{9}$$

Per tant, si una nòmina de 1000 euros pateix una reducció d'un 10% cal un increment del  $\frac{100}{9}$  %, és a dir d'un 11,11%, per recuperar la nòmina de 1000 euros.

*Criteris de correcció: a) Càlcul del nou valor de la nòmina: 0,5 p. b) Càlcul del nou valor de la nòmina: 0,5 p. c) Plantejament del problema: 0,5 p. Resolució: 0,5 p.*

5. Les pèrdues o els beneficis d'una empresa venen donats per la funció  $f(t) = \frac{3t-6}{t+2}$ , en què  $f(t)$  s'expressa en centenars de milers d'euros, un cop transcorreguts  $t$  anys des de l'inici del 2010.
- Feu un esbós de la gràfica de la funció  $f(t)$  per a  $t > 0$ , calculant els intervals de creixement, els talls amb els eixos i les asímptotes. [1 punt]
  - A l'inici de l'any 2010 quants euros perdia o guanyava l'empresa? Quins anys va tenir pèrdues l'empresa i a partir de quin any en va deixar de tenir? [0,5 punts]
  - A partir de quin any els guanys de l'empresa van ser més grans o iguals a un centenar de milers d'euros? Es poden superar els 3 centenars de milers d'euros de beneficis? Raoneu les respostes. [0,5 punts]
- a) Calculem la derivada de la funció  $f'(t) = \frac{12}{(t+2)^2}$ . Com que és positiva per a tot  $t$  la funció sempre és creixent. Trobem els talls amb els eixos (0,-3) i (2,0). Finalment tenim una asímptota horitzontal en  $y = 3$ .



- b)  $f(0) = \frac{-6}{2} = -3$ . A l'inici de l'any 2010 l'empresa perdia 300.000 euros. Per estudiar quins anys va tenir pèrdues i quan va deixar de tenir-les, resollem la inequació:  $f(t) \geq 0 \rightarrow 3t - 6 \geq 0 \rightarrow t \geq 2$ . A partir del 2012 l'empresa va començar a no tenir pèrdues, fins aleshores va tenir pèrdues.
- c) Caldrà resoldre  $f(t) \geq 1 \rightarrow 3t - 6 \geq t + 2 \rightarrow t \geq 4$ . A partir del 2014 els guanys van superar o igualar els 100.000 euros i  $f(t) \geq 3 \rightarrow 3t - 6 \geq 3t + 6 \rightarrow -6 \geq 6$  No pot ser! Els guanys de l'empresa mai superaran els 300.000 euros.

*Criteris de correcció: a) Justificació que la funció és sempre creixent: 0,25 p. Determinació del punt de tall (2,0): 0,25 p. Determinació de l'asímtota: 0,25 p. Esbós de la gràfica: 0,25 p. b) Determinació de les pèrdues de l'any 2010: 0,25 p. Determinació de l'any en què l'empresa comença a obtenir beneficis: 0,25 p. c) Determinació de l'any en què els beneficis superen els 100.000 euros: 0,25 p. Justificació que mai s'assoliran els 300.000 euros: 0,25 p.*

6. El preu en euros d'una pedra preciosa és cinc vegades el quadrat del seu pes en grams. Si tenim una pedra preciosa de 8 grams i ens plantegem partir-la en dos trossos:
- Quin pes ha de tenir cadascun dels trossos perquè el conjunt valgui el mínim possible? [1 punt]
  - Quin és el preu mínim i el preu màxim que pot valer aquest conjunt? [1 punt]
- a) Anomenem  $x$  i  $y$  el pes en grams de cadascun dels dos trossos. D'una banda tenim la condició  $x + y = 8$ , d'on  $y = 8 - x$ . D'altra banda, els possibles valors de  $x$  corresponen a l'interval  $[0,8]$ . El preu vindrà donat per la funció  $P(x) = 5x^2 + 5y^2 = 5x^2 + 5(8 - x)^2 = 10x^2 - 80x + 320$ . Per a trobar el mínim, fem la derivada i igulem a zero  $P'(x) = 0$ , és a dir,  $20x - 80 = 0$ , d'on obtenim  $x = 4$ . Com que la funció  $P'(x)$  és negativa per als valors inferiors a  $x = 4$  i positiva per als punts superiors, deduïm que es tracta d'un mínim. Per tant, el preu mínim s'obté quan els dos trossos pesen 4 grams cadascun.
- b) Els màxims i mínims absoluts de la funció els trobarem entre els relatius i els extrems de l'interval  $[0,8]$ . Observem que  $P(0) = P(8) = 320$  i  $P(4) = 160$ . Per tant, el preu mínim que podem pagar és de 160 euros quan els dos trossos són de 4 grams i el preu màxim és de 320 euros quan tenim un únic tros, és a dir, un tros de 0 grams i l'altre de 8 grams.

*Criteris de correcció: a) Determinació de la condició: 0,25 p. Determinació de la funció del preu: 0,25 p. Obtenció de la derivada: 0,25 p. Obtenció del mínim: 0,25 p. b) Obtenció de l'interval de valors de la variable: 0,5 p. Obtenció dels preus màxim i mínim: 0,5 p.*

6. Considereu les matrius:  $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  i  $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- Calculeu el valor del paràmetre  $a$  per al qual es compleix que  $A \cdot B = B \cdot A$ . [1 punt]
  - Per al valor  $a = 2$ , trobeu una matriu  $X$ , tal que  $A \cdot X \cdot A = B$ . [1 punt]
- a) Calculem els productes  $A \cdot B$  i  $B \cdot A$ :
- $$A \cdot B = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & -a+1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$
- per tal que es compleixi la igualtat cal que  $a = 1$ .
- b) Aïllant obtenim que  $X = A^{-1} \cdot B \cdot A^{-1}$ ,
- $$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad \text{fent els productes obtenim} \quad X = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

*Criteris de correcció: a) Càlcul dels productes de matrius: 0,25 p. cadascun. Trobar el valor del paràmetre  $a$ : 0,5 p. b) Aïllar l'equació matricial: 0,25 p. Càlcul de la inversa: 0,5 p. Determinació de la matriu  $X$ : 0,25 p.*